



LA GAMME FRONTLINE

Contre les puces et les tiques

- **Efficace** plusieurs semaines ⁽¹⁾
- **Résistant** à la pluie, aux bains et aux shampoings ⁽²⁾



La gamme FRONTLINE convient aux :

- Chiens et chats
- Chiots et chatons ⁽³⁾
- Animaux vivant à l'intérieur et à l'extérieur

Nouveau pour les furets ➤ FRONTLINE Combo Chat



710478

(1) 2 à 4 semaines contre les tiques selon les présentations - 4 semaines à 90 jours sur les puces selon les présentations

(2) Sans dépasser 1 fois par semaine. Ne pas mouiller l'animal dans les 48 heures suivant l'application du produit.

(3) À partir de 8 semaines et 1 kg pour les chats et à partir de 8 semaines et 2 kg pour les chiens.



LES puces

Quand un animal a des puces, très vite, toute la maison en a !

5 % des puces sont sur vos animaux : ce sont les puces adultes

95 % sont dans votre maison : c'est le "réservoir invisible" des puces (œufs, larves, cocons)



LES tiques

A l'extérieur, gare aux tiques !

Les tiques vivent dans les **forêts, prés, jardins** et même dans les **espaces verts** des centres-villes.



Les tiques peuvent transmettre des maladies graves comme la **maladie de Lyme** ou l'**ehrlichiose**, et mortelles comme la **piroplasmose**. Le délai de transmission de ces maladies, de la tique à l'animal, est en moyenne de 48 heures.



Il faut utiliser un médicament qui élimine les tiques en moins de 48 heures.





QUEL **FRONTLINE** POUR VOTRE ANIMAL ?

- Vous souhaitez traiter votre animal ou prévenir des infestations par les puces ou les tiques, et avoir une action préventive sur l'habitat ?

FRONTLINE Combo[®]



- Vous souhaitez traiter votre animal ou prévenir des infestations par les puces et les tiques ?

FRONTLINE[®] Spot-On l'alternative économique



- Vous faites face à une infestation massive ?
Vous avez plusieurs animaux ?

FRONTLINE[®] Spray



POUR VOS ANIMAUX : CHOISISSEZ LA QUALITÉ **FRONTLINE**



COMMENT BIEN APPLIQUER FRONTLINE ?

FRONTLINE Combo FRONTLINE Spot-On



- Appliquez 1 pipette :
 - adaptée à son poids
 - sur une peau bien sèche.
- Votre animal doit être âgé d'au moins 8 semaines.
- Attendre 2 jours après l'application de FRONTLINE avant de baigner votre animal.



Casser l'embout au niveau de la partie pré-découpée



Vider la totalité du contenu de la pipette sur la peau, entre les deux épaules de votre animal

2 Bien écarter les poils, puis appliquer l'embout de la pipette directement au contact de la peau de votre animal

3



FRONTLINE Spray

Posologie :

- Spray 100 ml :
6 à 12 pulvérisations par kg
- Spray 250 et 500 ml :
2 à 4 pulvérisations par kg



1

Porter des gants



2

Tenir le flacon à la verticale



3

Pulvériser FRONTLINE Spray à rebrousse-poil en respectant le nombre de pulvérisations par kg. Votre animal doit être uniformément mouillé par le produit



4

Frictionner votre animal pour favoriser le contact de FRONTLINE avec la peau



5

Pour traiter la tête de votre animal, déposer FRONTLINE Spray au creux de votre main gantée puis l'appliquer sur les zones délicates à traiter





FRONTLINE® : Composition qualitative et quantitative FRONTLINE Spot-On Chat Fipronil 50 mg, Butylhydroxyanisole E320 0.10 mg, Butylhydroxytoluène E321 0.05 mg, Ethanol 0.05 ml. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml. FRONTLINE Spot-On Chien S Fipronil 67 mg, Butylhydroxyanisole E320 0.134 mg, Butylhydroxytoluène E321 0.067 mg, Ethanol 0.067 ml. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml. FRONTLINE Spot-On Chien M Fipronil 134 mg, Butylhydroxyanisole E320 0.268 mg, Butylhydroxytoluène E321 0.134 mg, Ethanol 0.134 ml. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml. FRONTLINE Spot-On Chien L Fipronil 268 mg, Butylhydroxyanisole E320 0.54 mg, Butylhydroxytoluène E321 0.27 mg, Ethanol 0.268 ml. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml. FRONTLINE Spot-On Chien XL Fipronil 402 mg, Butylhydroxyanisole E320 0.80 mg, Butylhydroxytoluène E321 0.40 mg, Ethanol 0.402 ml. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml. **Forme pharmaceutique** Solution pour spot-on. **Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles** Affections à parasites sensibles au fipronil. *Chez les chats* Traitement curatif et préventif des infestations par les puces *Ctenocephalides felis* et par les tiques, élimination des poux broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de quatre semaines pour les puces et de deux semaines pour les tiques. *Chez les chiens* Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et les tiques, élimination des poux broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les puces et d'un mois pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la *Dermatite Allergique par Piqûres de Puces DAPP*. **Posologie** En application sur la peau. *Chats* Une pipette de FRONTLINE Spot-On Chat par animal 0.5 ml. *Chiens de 2 à 10 kg* : une pipette de FRONTLINE Spot-On S par animal 0.67 ml. *Chiens de 10 à 20 kg* : une pipette de FRONTLINE Spot-On M par animal 1.34 ml. *Chiens de 20 à 40 kg* : une pipette de FRONTLINE Spot-On L par animal 2.68 ml. *Chiens de 40 à 60 kg* : une pipette de FRONTLINE Spot-On XL par animal 4.02 ml. Pour les chiens de plus de 60 kg, appliquer une pipette de 4.02 ml ainsi qu'une pipette du volume inférieur approprié. En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines. **Contre-indications** *Chez les chats* En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chats de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades maladies systémiques, fièvre, etc... ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. *Chez les chiens* En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades maladies systémiques, fièvre, etc... ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ce produit a été spécialement développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage. **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux** : Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Éviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. **Effets indésirables (fréquence et gravité)** En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés : *Chez les chats* Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application desquamation, alopecie locale, prurit, érythème ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles hyperesthésie, abatement, symptômes nerveux ou des vomissements ont été observés après utilisation. *Chez les chiens* Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles hyperesthésie, abatement, symptômes nerveux, des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser. **Temps d'attente** Sans objet. **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché** MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. **Présentations** FRONTLINE Spot-On Chat FRV/8481982 4/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. FRONTLINE Spot-On Chien S FRV/1786870 3/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 4 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 12 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. FRONTLINE Spot-On Chien M FRV/8858273 3/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 4 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 12 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. FRONTLINE Spot-On Chien L FRV/6442706 9/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 4 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 12 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. FRONTLINE Spot-On Chien XL FRV/4589892 9/2001. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Date A.M.M. FRONTLINE Spot-On Chat: 16/02/96, FRONTLINE Spot-On Chien S, FRONTLINE Spot-On Chien M et FRONTLINE Spot-On L: 12/11/96 et FRONTLINE



Spot-On XL : 20/06/01. *Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Classement du médicament en matière de délivrance* Usage vétérinaire.

FRONTLINE Combo® : Composition qualitative et quantitative

FRONTLINE Combo Spot-On Chat Fipronil 50 mg. S -méthoprène 60.0 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.10 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.05 mg. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S Fipronil 67 mg. S -méthoprène 60.3 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.13 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.07 mg. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien M Fipronil 134 mg. S -méthoprène 120.6 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.27 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.13 mg. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien L Fipronil 268 mg. S -méthoprène 241.2 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.54 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.27 mg. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL Fipronil 402 mg. S -méthoprène 361.8 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.80 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.40 mg. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml. **Forme pharmaceutique** Solution pour spot-on. Solution claire ambrée. **Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et les tiques et/ou les poux broyeur. *Chez les chiens* - Traitement de l'infestation par les puces *Ctenocephalides spp.*. L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application. - Traitement de l'infestation par les tiques *Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines. - Traitement de l'infestation par les poux broyeur *Trichodectes canis*. Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP*. *Chez les chats* Elimination des puces *Ctenocephalides spp.*. L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application. Elimination des tiques *Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines. Elimination des poux broyeur *Felicola subrostratus*. Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP*. *Chez les furets* : - A utiliser contre les infestations par des puces seules ou des infestations mixtes par des puces et des tiques. - Elimination des puces *Ctenocephalides spp.*. L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes. - Elimination des tiques *Ixodes ricinus*. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales pendant 4 semaines. **Posologie Chats** : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de S -méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml pour un chat. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. *Furets* : Une pipette de 0.5 ml par furet, soit une dose de 50 mg de fipronil et 60 mg de S -méthoprène par furet, en une application cutanée. L'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. *Chiens* : la dose minimale recommandée est de 6.7 mg de fipronil et de 6 mg de S -méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée. *Chien de 2 à 10 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal 0.67 ml, *Chiens de 10 à 20 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal 1.34 ml, *Chiens de 20 à 40 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal 2.68 ml, *Chiens de plus de 40 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal 4.02 ml. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. **Contre-indications** En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les furets de moins de 6 mois ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades par exemple : maladies systémiques, fièvre ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. En l'absence d'étude, l'utilisation du produit n'est pas recommandée pour les espèces non cibles. FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats ou les furets car cela peut conduire à un surdosage. **Effets indésirables (fréquence et gravité)** Ne pas surdoser. *Chats* Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. De la salivation excessive, des signes nerveux réversibles augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée. *Chiens*: Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due

principalement à la nature de l'excipient peut être observée. **Temps d'attente** Sans objet. **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché** MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. **Présentations** FRONTLINE Combo Spot-On Chat FRV/3168431 0/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S FRV/7543476 4/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien L FRV/2879019 8/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL FRV/8787746 7/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. *Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Classement du médicament en matière de délivrance* Usage vétérinaire.

FRONTLINE® Spray : Composition qualitative et quantitative Fipronil 2.5 mg. Excipient QSP 1 ml. **Forme pharmaceutique** Solution pour pulvérisation cutanée. **Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

Affections à parasites sensibles au fipronil chez les chiens et chats de moins de 5 kg pour FRONTLINE® Spray Pompe 0.5 ml et chez les chiens et chats de plus de 5 kg pour FRONTLINE® Spray Pompe 1.5 ml. *Chez les chiens* : - Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques. - Elimination des poux broyeur. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les puces varie de 60 à 90 jours. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les tiques est d'environ 30 jours. *Chez les chats* : - Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques. - Elimination des poux broyeur. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les puces est d'environ 40 jours. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les tiques est de 2 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP*. **Posologie** Voie d'administration : cutanée, en pulvérisation. La posologie de base est de 7.5 mg/kg de fipronil par kg de poids corporel soit 3 ml de solution par kg soit 6 pressions de la pompe 0.5 ml par kg et 2 pressions de la pompe 1.5 ml par kg. Cette posologie peut être portée jusqu'à 15 mg de fipronil par kg soit 6 ml de solution par kg 12 pressions de la pompe 0.5 ml par kg et 4 pressions de la pompe 1.5 ml par kg pour tenir compte de la longueur des poils et permettre une imprégnation complète de l'animal. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. **Contre-indications** Ne pas utiliser chez les animaux malades maladies systémiques, fièvre... ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux** : Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Il faut donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le produit. Éviter le contact du contenu avec les doigts. En cas de contact, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition accidentelle des yeux, rincer à l'eau avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le pelage soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. Comme pour tous les insecticides, il est recommandé de porter des gants et de traiter les animaux dans un local bien aéré. Ne pas respirer le produit. **Effets indésirables (fréquence et gravité)** En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires, érythème, prurit ou alopecie ont été rapportés après utilisation. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux, des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Les effets observés sont susceptibles d'être plus sévères chez les chiots de moins de 6 mois. Ne pas surdoser. **Temps d'attente** Sans objet. **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché** MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. **Présentations** FRV/1803950 2/1994 Boîte de 1 flacon de 125 ml rempli à 100 ml et de 1 pompe doseuse délivrant 0.5 ml par pulvérisation FRV/7290635 8/1994 Flacon de 250 ml muni d'une pompe doseuse de 1.5 ml Flacon de 500 ml muni d'une pompe doseuse de 1.5 ml Date A.M.M. 24/05/94. *Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Classement du médicament en matière de délivrance* Usage vétérinaire

